

Post-test

1. Il megacolon tossico può essere prevalentemente associato a:	
A	Epatite virale
B	Diverticolosi non complicata
C	Emobilia
D	Ulcera peptica
E	Colite ulcerosa

2. L'abuso di quale delle seguenti categorie di farmaci possono portare alla comparsa del megacolon tossico:	
A	Antiemetici
B	Antibiotici beta-lattamici
C	Antibiotici macrolidi
D	Antidiarroici
E	Antistaminici

3. La laparotomia esplorativa di un paziente affetto da megacolon tossico evidenzierà	
A	Un colon dilatato per tutta la sua lunghezza
B	Un colon presentante una dilatazione craniale ed un restringimento caudale
C	Un colon presentante un restringimento craniale ed una dilatazione caudale
D	Un trasverso sempre dilatato, prescindendo dalla sede affetta
E	Un aumento della fisiologica peristalsi nel contesto della sede affetta

4. Il tratto a monte del colon affetto avrà	
A	Pareti normali
B	Pareti ispessite
C	Pareti assottigliate
D	Pareti collabite
E	Stenosi diffuse

5. Un paziente affetto da megacolon tossico riferirà	
A	Una normale evacuazione
B	Stipsi
C	Diarrea
D	Alvo alterno
E	Melena

6. Quale delle seguenti non è indicazione all'intervento chirurgico?:	
A	Diametro viscere maggiore di 12 cm
B	Ileo paralitico
C	Peritonismo
D	Perforazione
E	Nessuno dei precedenti

Il megacolon tossico

7. Quale delle seguenti affezioni non può provocare megacolon tossico?:	
A	Colite pseudomembranosa
B	Morbo di Crohn
C	Rettocolite ulcerosa
D	Tumori del colon stenosanti
E	Nessuno dei precedenti

8. Quale dei seguenti esami non viene utilizzato per la diagnosi di megacolon tossico?:	
A	Rx addome diretto
B	RMN
C	Tc addome
D	Rx clisma
E	Nessuno dei precedenti

9. Tra le seguenti terapie non chirurgiche, cosa non deve essere utilizzato?:	
A	Idratazione e nutrizione parenterale
B	Terapia antibiotica
C	Sondino naso-gastrico
D	Clisteri evacuativi
E	Nessuno dei precedenti