

Pre-test

1. Il megacolon tossico può essere prevalentemente associato a:	
A	Epatite virale
B	Diverticolosi non complicata
C	Emobilia
D	Ulcera peptica
E	Colite ulcerosa

2. L'abuso di quale delle seguenti categorie di farmaci possono portare alla comparsa del megacolon tossico:	
A	Antiemetici
B	Antibiotici beta-lattamici
C	Antibiotici macrolidi
D	Antidiarroici
E	Antistaminici

3. La laparotomia esplorativa di un paziente affetto da megacolon tossico evidenzierà:	
A	Un colon dilatato per tutta la sua lunghezza
B	Un colon presentante una dilatazione craniale ed un restringimento caudale
C	Un colon presentante un restringimento craniale ed una dilatazione caudale
D	Un trasverso sempre dilatato, prescindendo dalla sede affetta
E	Un aumento della fisiologica peristalsi nel contesto della sede affetta

4. Il tratto a monte del colon affetto avrà:	
A	Pareti normali
B	Pareti ispessite
C	Pareti assottigliate
D	Pareti collabite
E	Stenosi diffuse

5. Un paziente affetto da megacolon tossico riferirà:	
A	Una normale evacuazione
B	Stipsi
C	Diarrea
D	Alvo alterno
E	Melena